

Portfólio LINHA CANA

Ao lado de quem produz hoje e amanhã.



#CanaÉCorteva

Coact®

HERBICIDA

Ingrediente ativo: Diclosulam 840 g i.a./kg.

Modo de ação: inibidor de ALS (Grupo B).

Posicionamento: herbicida seletivo, sistêmico, aplicado no período úmido em pré ou pós-emergência da cana planta ou cana soca (com ou sem palha), para controle de folhas largas, estreitas e Cyperaceas em pré-emergência.

Alvos: capim-marmelada, capim-colchão, corda-de-violão e tiririca.

Dontor®

HERBICIDA

Ingrediente ativo: Picloram Sal Dimetilamina 22,5 g e.a./kg + 2,4-D Sal Dimetilamina 360 g e.a./kg (equivalente ácido).

Modo de ação: mimetizador de Auxina (Grupo O).

Posicionamento: herbicida seletivo, recomendado para controle em pós-emergência inicial das plantas daninhas de folha larga, podendo ser aplicado em época úmida e semiúmida, em cana planta e cana soca.

Alvos: caruru-de-mancha, picão-preto, trapoeraba, corda-de-violão e guanxuma.

Front®

HERBICIDA

Ingrediente ativo: Hexazinona 170 g i.a./kg + Diurum 603 g i.a./kg + Sulfometurom 14,5 g i.a./kg.

Modo de ação: inibidor de fotossistema II (Grupo C1) + inibidor de fotossistema II (Grupo C2) + Inibidor de ALS (Grupo B).

Posicionamento: herbicida seletivo, aplicado no período seco e semiúmido em pré-emergência da cana soca (com ou sem palha).

Alvos: capim-colchão (inclusive *D. Nuda*), capim-braquiária, capim-marmelada, capim-colonião, capim-massambará e corda-de-violão, capim-mão-de-sapo, corda-de-violão e trapoeraba.

Combine® 500 SC

HERBICIDA

Ingrediente ativo: Tebutiurum 500 g i.a./L.

Modo de ação: inibidor da fotossíntese no fotossistema II (Grupo C2).

Posicionamento: herbicida seletivo, recomendado para cana planta ou cana soca em pré-emergência das plantas daninhas.

Alvos: capim-colchão, capim-braquiária, capim-marmelada, capim-colonião, carrapicho, pé-de-galinha, trapoeraba, corda-de-violão, beldroega.

DMA® 806 BR

HERBICIDA

Ingrediente ativo: 2,4-D Sal Dimetilamina 670 g e.a./L.

Modo de ação: mimetizador de Auxina (Grupo O).

Posicionamento: herbicida seletivo de ação sistêmica, recomendado para controle em pós-emergência inicial das plantas daninhas de folhas largas, podendo ser aplicado em época úmida e semiúmida, em cana planta e cana soca.

Alvos: caruru-de-mancha, beldroega, trapoeraba, guanxuma, corda-de-violão e tiririca.

Volcane®

HERBICIDA

Ingrediente ativo: MSMA 790 g i.a./L.

Modo de ação: organoarsenical (Grupo Z).

Posicionamento: herbicida não seletivo, não sistêmico, pós-emergente para controle de gramíneas na época úmida.

Alvos: capim-colchão, capim-colonião, capim-braquiária, capim-carrapicho, marmelada, picão-preto, caruru-verde e corda-de-violão.

LINHA CANA

Glizmax® Prime

HERBICIDA

Ingrediente ativo: Glifosato Sal Dimetilamina 480 g e.a./L (equivalente ácido).

Modo de ação: inibidor da EPSPs (Grupo G).

Posicionamento: aplicação em pós-emergência das plantas daninhas em boas condições de desenvolvimento, bem como eliminação de soqueira de cana-de-açúcar e maturador de cana-de-açúcar.

Alvos: capim-braquiária, capim-marmelada, braquiaraço, capim-colchão, capim-carrapicho, capim-colonião, capim-pé-de-galinha, grama-seda, beldroega, caruru, corda-de-viola, guaxuma e cana-de-açúcar.

Revolux®

INSETICIDA

Ingrediente ativo: Metoxifenoazida 300 g i.a./L + Espinotoram 60 g i.a./L.

Modo de ação: agonistas de receptores de ecdisteroides (Grupo 18) + moduladores alostéricos de receptores nicotínicos da acetilcolina (Grupo 5).

Posicionamento: inseticida de contato e ingestão, lipofílico e translaminar para aplicações foliares, aéreas e tratorizadas, conforme monitoramento da praga.

Alvo: broca da cana-de-açúcar.

Approach® Prima

Onmira® active

FUNGICIDA

Ingrediente ativo: Onmira (Picoxistrobina) 200 g i.a./L + Ciproconazole 80 g i.a./L.

Modo de ação: inibidores extracelulares de Quinona (Grupo C3) + inibidores da desmetilação (Grupo G1).

Posicionamento: utilizado em pulverizações preventivas para o controle de ferrugem alaranjada.

Alvo: ferrugem alaranjada.

Onmira® active (Picoxistrobina) é o principal ingrediente ativo da linha de fungicidas da Corteva. Traz alta tecnologia, visivelmente mais proteção e melhores resultados para sua lavoura.

Curavial®

MATURADOR

Ingrediente ativo: Sulfometurom 750 g i.a./kg.

Modo de ação: inibidor de ALS (Grupo B).

Posicionamento: utilizado em aplicações aéreas para maturação de cana-de-açúcar em áreas de pleno desenvolvimento vegetativo.

Alvo: maturador de cana-de-açúcar.

RIZOTEC

BIONEMATICA



Ingrediente ativo: *Pochonia chlamydosporia*, cepa Pc10 (5,2x10⁷ clamidósporos/g) 280 g/kg.

Modo de ação: desintegração e remoção enzimática da casca do ovo.

Posicionamento: aplicação em cana planta e cana soca úmida e seca.

Alvo: nematoide-das-galhas.

ATENÇÃO

PRODUTO PERIGOSO À SAÚDE HUMANA, ANIMAL E AO MEIO AMBIENTE; USO AGRÍCOLA; VENDA SOB RECEITUÁRIO AGRÔNOMICO; CONSULTE SEMPRE UM AGRÔNOMO; INFORME-SE E REALIZE O MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS; DESCARTE CORRETAMENTE AS EMBALAGENS E OS RESTOS DOS PRODUTOS; LEIA ATENTAMENTE E SIGA AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NO RÓTULO, NA BULA E NA RECEITA; E UTILIZE OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.

O aumento da produtividade e rentabilidade foi observado em campos experimentais, onde foram utilizados os produtos, seguindo corretamente as informações de dosagem e aplicação. O aumento de produtividade e rentabilidade depende também de outros fatores, como condições de clima, solo, manejo, estabilidade do mercado, entre outros. Rizotec é um produto do grupo Stoller, aprovado para uso na agricultura orgânica pela certificação de Insumos IBD.



CORTEVATM
agriscience

Visite-nos em **corteva.com.br** | **0800 772 2492**

TM e [®] Marcas registradas da Corteva Agriscience e de suas companhias afiliadas. ©2021 Corteva.